

CONSEJOS DE SEGURIDAD: PRECAUCIÓN Evite respirar la niebla o los vapores. Utilizar guantes y gafas de protección al mezclar o manipular el producto. Lavarse bien con agua y jabón después de manipular el producto. Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a utilizarla.

No aplicar cuando los polinizadores estén forrajando activamente.

PRIMEROS AUXILIOS:	
Tenga a mano la etiqueta del producto si necesita asistencia médica o tratamiento.	
Si entra en contacto con los ojos:	<ul style="list-style-type: none"> Enjuagar los ojos con abundante agua durante varios minutos, manteniendo los párpados separados. Quitarse las lentes de contacto si le resulta fácil y continúe enjuagándose durante varios minutos más. Si la irritación persiste, acuda al médico.
Si está en la piel o en la ropa:	<ul style="list-style-type: none"> Quitarse la ropa contaminada. Enjuagar bien la piel con agua durante varios minutos. Acudir al médico si se produce irritación o erupción cutánea.
Si se ingiere:	<ul style="list-style-type: none"> No provocar el vómito a menos que lo indique el personal médico. Si se presentan síntomas, acuda al médico.
En caso inhalación:	<ul style="list-style-type: none"> Trasladar a la persona al aire libre. Llamar a un médico si la persona tiene dificultad para respirar o persiste la irritación.

PELIGROS FÍSICOS Y QUÍMICOS: No aplicar sobre cables eléctricos ni alrededor de ellos. No aplicar sobre superficies o equipos calientes.

INSTRUCCIONES DE USO: LEER TODA LA ETIQUETA - UTILIZAR SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA

Sitios de uso: Interiores: Esto incluye, entre otros, edificios de departamentos, panaderías, fábricas de bebidas, instalaciones de embotellado, carcerías, cafeterías, fábricas de dulces, plantas de procesamiento y fabricación de cereales, establos lecheros, instalaciones avícolas, molinos harineros, plantas de procesamiento de alimentos, plantas de alimentos congelados, hogares, hospitales, hoteles, casas, edificios industriales, perreras, cocinas, laboratorios, instalaciones de fabricación, mausoleos, plantas de procesamiento y envasado de carne, fábricas de conservas de carne y verduras, moteles, residencias de ancianos, edificios de oficinas, restaurantes, escuelas, tiendas, supermercados, almacenes y estructuras similares.

Sitios de uso: Exteriores: Incluye, entre otros, cimientos de edificios, instalaciones lecheras, restaurantes y cines con entrada para vehículos, campos de golf, parques, patios de recreo, gallineros, espacios recreativos, escuelas, áreas urbanas, césped, jardines, árboles, prados, zoológicos y lugares de uso similar.

Sitios de uso: Modos de transporte: Aviones, autobuses, camiones, remolques, vagones de ferrocarril y embarcaciones marítimas.

INSTRUCCIONES DE MEZCLA Y EQUIPO DE APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. Peritect 360 IC puede diluirse con agua y aplicarse con equipos de aplicación convencionales, incluidos, entre otros, pulverizadores de aire comprimido y pulverizadores mecánicos. Al diluirlo con agua, prepare únicamente la cantidad necesaria para su uso inmediato. Las aplicaciones de mezcla en tanque deben realizarse siguiendo las limitaciones y precauciones más restrictivas de la etiqueta. Este producto no puede mezclarse con ningún producto cuya etiqueta prohíba dicha mezcla. Los resultados más eficaces se consiguen cuando se utiliza como parte de un protocolo de tratamiento que incluye medidas físicas, ambientales y otras medidas químicas de control de plagas.

Método de aplicación: En pulverizadores de aire comprimido o de mochila motorizada, de mano o de otro tipo, aplicar con las soluciones diluidas que se indican a continuación, por cada 1,000 pies cuadrados, hasta que el área quede completamente mojada. En sistemas de nebulización o rociadores, aplique a una cantidad de 0.2 galones/1,000 pies cúbicos. Aplicar tantas veces como sea necesario.

NOTA: Para superficies interiores o exteriores sensibles como vinilo, plástico, tela, pisos de madera, etc., pruebe primero en una pequeña área no visible antes de rociar. Esto incluye revestimientos de vinilo, muebles de jardín, puertas y ventanas contra tormentas, etc. Es posible que Peritect 360 IC dañe algunas superficies sensibles. Si el producto pulverizado entra en contacto con alguna de las superficies sensibles indicadas, simplemente enjuague con agua y limpie con un paño limpio.

Mezcla (Pulverizadores de aire comprimido o de mochila, portátiles u otros):

PLAGAS	Tasa de Dilución
Cucarachas	12 fl oz / gal
Hormigas	2 fl oz - 4 fl oz / gal
Chinchies (Adultos y Ninfas)	4 fl oz / gal
Pulgas	4 fl oz / gal
Moscas	1 fl oz - 2 fl oz / gal
Arañas	8 fl oz - 12 fl oz / gal
Mosquitos	1 fl oz - 2 fl oz / gal



Peritect

360 IC

Concentrado de insecticida

Insecticida de amplio espectro: Elimina insectos rastreros y voladores (según la lista)

Fácil de mezclar, permanece en suspensión (agitar bien antes de usar)

Insecticida 25(b) analizado en laboratorio

Uso en interiores y exteriores

Riesgo mínimo

Ingredientes activos:

Geraniol.....	31.5%
Lauril sulfato de sodio.....	14.0%
Aceite de menta.....	3.5%
Aceite de clavo.....	3.5%
Ingredientes inertes.....	47.5%
Agua, lactato de etilo, jabón, oleato de poliglicerilo	
Total.....	100.0%

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN

Este producto no ha sido registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Liphatech, Inc declara que este producto está exento de registro en virtud de la FIFRA. Seguro y eficaz si se utiliza y almacena según las instrucciones

LIPHATECH®

Liphatech, Inc.
3600 W. Elm Street
Milwaukee, WI 53209
(800) 351-1476

Uso en interiores: Para controlar las etapas accesibles y expuestas de insectos rastreros o voladores, incluidos, entre otros, hormigas, chinchies (adultos y ninfas), cucarachas, pulgas, moscas, mosquitos y arañas. Diluya el producto según la tabla anterior, utilice la tasa más baja o más alta del espectro para cada plaga para mantenimiento e infestaciones activas según sea necesario y aplique en la proporción de 1 galón por 1,000 pies cuadrados o hasta que el área esté completamente mojada.

PULGAS: Para el tratamiento antipulgas, aspire y limpie bien los pisos y la tapicería previamente. Mezcle Peritect 360 IC como se indica más arriba y aplíquelo como tratamiento puntual en grietas, hendiduras, zócalos, suelos y tapicerías. En colchones y muebles, trate únicamente las partes que puedan albergar plagas. Repita según sea necesario.

Chinchies (adultos y ninfas): Cuando trate chinchies, limpie y aspire bien los colchones y resortes antes del tratamiento. Mezcle Peritect 360 IC como se indica más arriba y aplíquelo como tratamiento puntual en grietas y hendiduras, alrededor de zócalos, tarimas, cabeceras y paredes. En hoteles y otros alojamientos públicos, preste especial atención a los portaequipajes y la zona adyacente. En colchones y resortes, trate solo las partes que puedan albergar plagas. Procure centrarse en los mechones, las costuras, los pliegues y las arrugas. Repita, según sea necesario. Para evitar una posible decoloración, no pulverice sobre áreas visibles (es decir, zócalos, marcos de puertas, paredes, etc.) y retire el exceso con un paño.

PULVERIZACIÓN: Para controlar insectos rastreros y voladores (incluyendo moscas domésticas, mosquitos, jejenes, moscas de la fruta, moscas foridas) en lugares que incluyen, entre otros, plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones industriales, cuartos de animales y almacenes, Peritect 360 IC puede aplicarse como pulverización espacial a través de sistemas de nebulización de equipos de nebulización convencionales (incluidos pulverizadores de niebla y sopladores de niebla), sistemas de pulverización automatizados, nebulizadores ULV, drones UAV o tecnologías de aplicación relacionadas. En sistemas de nebulización o rociadores, aplique a una cantidad de 0.2 galones/1,000 pies cúbicos. Aplicar tantas veces como sea necesario.

PLANTAS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS, INCLUIDAS LAS INSPECCIONADAS A NIVEL FEDERAL: Al utilizar este producto como pulverizador espacial en plantas de procesamiento de alimentos, retire o cubra los alimentos durante el tratamiento. No aplicar como pulverización espacial mientras se procesan alimentos. Las superficies y el equipo de procesamiento de alimentos deben cubrirse durante el tratamiento o limpiarse con un detergente eficaz y enjuagarse con agua potable antes de volver a utilizarse. Las operaciones de procesamiento de alimentos pueden continuar cuando el producto se aplica como pulverización de superficie con cuidado y siguiendo las instrucciones y precauciones.

Uso al aire libre: Para tratamientos perimetrales, hormigas de los montículos, tratamiento del césped contra pulgas, mosquitos y otros insectos voladores, césped, hierba, árboles ornamentales y arbustos, como pulverización o nebulización. Diluya el producto según la tabla anterior, use la proporción más baja o más alta del espectro para cada plaga para mantenimiento e infestaciones activas según sea necesario y aplique a una cantidad de 1 a 2 galones por cada 1,000 pies cuadrados o hasta que el área esté completamente mojada. Aplíquelo también a una banda de tierra y vegetación de 6 a 10 pies de ancho alrededor de los edificios y junto a ellos. Trate los cimientos del edificio a una altura de 2 a 3 pies con agua suficiente para cubrirlos. Realice un esfuerzo adicional para fumigar las zonas en las que se congregan las especies plaga, como, por ejemplo, los contenedores de residuos y basura, las mesas de picnic desocupadas, el exterior de los establecimientos de manipulación de alimentos y los pabellones de comida. También debe aplicarse alrededor de las posibles zonas de entrada como, por ejemplo, aleros, ventanas, puertas, porches, luces de porche y alrededor de las cajas de servicios.

NOTA: Evitar el tratamiento alrededor o sobre plantas sensibles; el producto podría tener reacciones fitotóxicas a concentraciones más elevadas con plantas sensibles. Si le preocupa una planta específica, pruebe primero un área pequeña y espere 48 horas. Superar las dosis o diluciones recomendadas puede dañar las plantas. Queda prohibido su uso en cultivos destinados a la alimentación humana o animal.

ARAÑAS, INSECTOS VOLADORES Y OTRAS PLAGAS MOLESTAS EN LOS MUELLES Y SUS ALREDEDORES: Como una ayuda para eliminar sus áreas de refugio, diluya Peritect 360 IC como se indica arriba y aplique una dosis de 1-2 galones por cada 1,000 pies cuadrados o hasta que el área esté completamente mojada. Como los insectos voladores pueden entrar y salir del área de tratamiento, se recomienda utilizar este producto como parte de un programa de Control Integrado de Plagas (Integrated Pest Management, IPM). Esto incluye, entre otros, eliminar los lugares de reproducción y refugio. No aplicar directamente sobre el agua.

CONTROL DE MOSQUITOS Y MOSCAS - TRATAMIENTO DE PATIOS EXTERIORES O BARRERAS: Para controlar mosquitos adultos y otras moscas picadoras mediante aplicación terrestre, diluya Peritect 360 IC como se indica más arriba. Trate las zonas de refugio, como arbustos y vegetación donde puedan posarse mosquitos y moscas. Pueden tratarse arbustos y vegetación alrededor de piscinas estancadas, áreas pantanosas, estanques y costas. Repita según sea necesario. No aplicar directamente sobre el agua.

MÉTODO DE EMPAPADO DE MONTÍCULOS - PARA EL CONTROL DE HORMIGAS DE MONTÍCULOS: Diluya Peritect 360 IC como se indica más arriba (utilice tasas de dilución más bajas para aplicaciones preventivas). Los sistemas de pulverización automática no deben programarse para liberar plaguicidas en lugares en los que haya alimentos o piensos directamente expuestos. Para controlar moscas, moscas domésticas, moscas de los cuernos, moscas de los establos, moscas de los caballos, mosquitos y jejenes, añada concentrado al depósito y agregue agua para obtener la dilución deseada. En sistemas de pulverización automática, como sistemas de nebulización utilizados para el control de mosquitos y otros insectos picadores, las soluciones de Peritect 360 IC pueden almacenarse durante largos períodos de tiempo, que no deben exceder de un mes, siempre que el sistema tenga agitación. No debe utilizarse en sistemas de pulverización automática en Connecticut.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN: No contamine el agua, los alimentos o los piensos por almacenamiento o eliminación. **Almacenamiento de pesticidas:** Conservar en posición vertical en su envase original, en un lugar inaccesible para niños y mascotas. Limpiar cualquier derrame de inmediato. Almacenar en un lugar fresco, seco y oscuro. En caso de derrame, cubrir con un material absorbente inerte y eliminar según la sección Manipulación de envases. **Eliminación de pesticidas / Manipulación de envases:** No reutilizar ni rellenar este envase con materiales distintos a Peritect 360 IC o derivados diluidos o enjuagados por el usuario final según las instrucciones de uso. **Si está vacío:** Depositar en la basura u ofrecer para reciclaje, si está disponible.

Si está parcialmente lleno: Llamar a su agencia local de residuos sólidos para obtener instrucciones sobre su eliminación. No tirar nunca el producto no utilizado por ningún desagüe interior o exterior. Desechar el contenido y el recipiente siguiendo las regulaciones locales y nacionales.

GARANTÍA: En la medida en que sea compatible con la legislación aplicable, el vendedor no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en relación con el uso de este producto que no sea la indicada en la etiqueta. El comprador asume todos los riesgos de uso o manipulación de este material cuando dicho uso o manipulación sea contrario a las instrucciones de la etiqueta.